

1. NOMBRE COMERCIAL

ARQUERO

2. NÚMERO DE REGISTRO

Registro Nacional: 44 - I 8/NA CL-2

3. COMPOSICIÓN

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	TIPO DE FORMULACIÓN
Benfuracarb	400 g/l	Concentrado Emulsionable (EC)

4. MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Insecticida sistémico de acción de contacto e ingestión. Pertenecce al grupo de los Carbamatos, controla una amplia gama de insectos tanto foliares como del suelo y en tratamiento de semillas. Inhibidor de la colinesterasa.

5. MODO DE EMPLEO

En un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada de ARQUERO con un poco de agua hasta formar una solución homogénea, luego verterla en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

6. COMPATIBILIDAD

Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala previa a la aplicación. Incompatible con productos alcalinos.

7. TOXICIDAD

CATEGORIA TOXICOLOGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO

8. USOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	Periodo de carenia
Rosas (<i>Rosa</i> sp.)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0,75 l/ha*	No aplica

*1.000 litros de agua por hectárea.

Volumen de agua: se recomienda calibrar el equipo de aspersión para conocer la cantidad de agua a utilizar para cubrir el área a tratar.

Restricción de Uso: únicamente para cultivo de Rosas en condiciones de invernadero.

9. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda una sola aplicación de ARQUERO cuando exista el 5% de incidencia de la plaga, adultos o ninfas en botones de Rosas desde del punto “rayando color”. Aplicar de forma homogénea en las hojas y en botones de Rosas, en especial el tercio superior.

10. FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si es utilizado de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.