

FICHA TECNICA

FENDDOR

TIPO DE PRODUCTO

Desinfectante agrícola de uso múltiple.

FENDDOR es un desinfectante agrícola con acción fungicida y bactericida de amplio espectro. Está diseñado para el uso en cultivos agrícolas para el control integrado de hongos tales como Oidio (Odio sp.) Botrytis (Botrytis cinérea), Rizoctonia, Fusarium, damping y bacteriosis entre otras.

FORMULACIÓN

Líquido, solución concentrada

COMPOSICIÓN

Ciclohexanol monoterpeno	55 g/l
Plata Coloidal	200 ppm
Solventes e inertes	93,98%

FORMA DE APLICACIÓN

Foliar o Termonebulización


INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Dosis		Forma de aplicación
Tomate riñón (Solanum lycopersicum)	1cc/l		
Pimiento (Capsicum annuum)			Foliar
Sandia (Citrullus lanatus)			
Melón (Cucumis melo)	500 cc/ha		Foliar
Cebolla (Allium cepa)			
Frutilla (Fragaria vesca)			
Mango (Mangifera indica)	500 cc/ha		
Limón (Citrus × limon)			Foliar
Cacao (Theobroma cacao)	500 cc/ha		
Banano (Musa × paradisiaca)	500 cc/ha		Foliar
Papaya (Carica papaya)	1 cc/lt		Foliar
Arroz (Oryza sativa)			
Maíz (Zea mays)	1 cc/lt		Foliar
Soya (Glycine max)			
Ornamentales para el control de oidio y	1 a 1,25 cc/lt		Foliar
botrytis		\perp	
DESINFECCIÓN ESPACIOS CERRADOS	Puro 1cc / m3		Termonebulización

PRESENTACIÓN

Frascos de litro, galones de 4 litros y canecas de 20 litros







INDICACIONES DE USO

APLICACIONES EN ASPERCIÓN:

Realizar una premezcla con un poco de agua usando la dosis indicada en el cuadro de dosificaciones, posteriormente verter en el tanque de aplicación final. Aplicar al cultivo en aspersión procurando tener una cobertura total, para ello es recomendable usar un coadyuvante que ayude en la cobertura.

APLICACIONES EN TERMONEBULIZACIÓN

Desinfección continua a nivel atmosférico y de superficies en el sector hospitalario, clínico, farmacéutico, alimentos, industrial, comercial y agroindustrial

Actividad antimicrobiana: Bactericida, Viricida y Fungicida.

Amplio espectro de actividad

Tiempo de carencia antes de reingreso: 15 minutos

Para aplicaciones con termonebulizador usar el producto puro a razón de 1ml x 1m3 de área a desinfectar sin personas dentro del área a tratar

En su aplicación usar protección respiratoria con filtros para gases y nieblas, hacer uso de guantes de nitrilo o caucho, protección ocular para salpicaduras (leer hojas de seguridad)

Contiene agentes fumígenos biodegradables de grado farmacéutico