



FUNGITRAM

(Thiram 420 g/l, SC)

IDENTIFICACIÓN

Nombre Común: Thiram
Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Concentración: 420 g/l
Grupo químico: Ditiocarbamato

Registro Nacional N°: **60 – F 5 / NA**

Presentaciones: 500 ml, 1 L, 1 Gal, 20 L, 200 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Blanco
Olor: Característico.
Presión de vapor a 20 ° C: 2.3 mPa
Coefficiente de partición (n-octanol/agua): log P 1.73 (pH 7, 20°C)
Solubilidad a 20 °C: En agua 18 mg/l (temperatura ambiente).
Estabilidad: Estable cuando se almacena bajo condiciones normales de temperatura, presión y humedad durante 2 años.

TOXICOLOGÍA

Categoría Toxicológica III LIGERAMENTE PELIGROSO

Toxicidad oral aguda de rata LD₅₀ > 2000 mg / kg p.c.
Toxicidad dérmica aguda de rata LD₅₀ > 4000 mg / kg p.c.
Toxicidad por inhalación aguda de rata LC₅₀ > 2.33 mg/l de aire
Irritación de la piel en el conejo: no irritante para la piel de conejo
Irritación de los ojos de conejo: ligeramente irritante para los ojos de conejo
Sensibilización de la piel en cobayos: no es sensibilizante

MODO DE ACCIÓN

FUNGITRAM Es un fungicida de contacto con actividad preventiva. Actúa formando una barrera con la superficie de las hojas y demás partes tratadas de la planta impidiendo que las esporas de los hongos puedan germinar, evitando de esta manera el inicio de la plaga.

MECANISMO DE ACCIÓN

FUNGITRAM Actúa mediante la inhibición de la germinación de esporas y el crecimiento del micelio. Además, tiene propiedades repelentes causadas por la aversión al gusto. Con actividad multi-sitio.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar **FUNGITRAM** en suspensión, solo en aceite o en emulsión de agua – aceite.

ULTIMA REVISION
10/06/2021

AR-006 FT
APROBADO: DPTO.
REGISTROS





FUNGITRAM

(Thiram 420 g/l, SC)

Emulsión: colocar la cantidad de aceite agrícola recomendada, entre 4 l/ha, en el tanque de mezcla y ponga a funcionar el agitador. Agregue el emulsificante en proporción del 1% en relación al volumen de aceite agrícola y mantenga en agitación durante 5 minutos. Por último, completar con agua hasta obtener el volumen requerido de mezcla y mantener la agitación por 10 a 15 minutos.

CULTIVO	PLAGA	Dosis *	P.C.** (días)
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1.75 l/ha	14
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	2 ml/l	N/A

*Volumen de agua: **Banano:** 11-15 litros / ha (aplicación aérea). **Rosa:** 1500 l/ha

** P.C.: Periodo de carencia

Época y frecuencia de aplicación: **Banano:** Se recomienda aplicar **FUNGITRAM** de manera preventiva. En tres aplicaciones con frecuencia de 7 días. **Rosa:** Se recomienda realizar dos aplicaciones de manera preventiva a un intervalo de 7 días.

Reingreso al área tratada: Se debe esperar 12 horas para reingresar al área tratada.

Fitotoxicidad.- El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

El producto es incompatible con materiales oxidantes, ácidos o álcalis fuertes y agentes nitrantes.

FABRICADO Y FORMULADO POR:



PARIJAT INDUSTRIES PVT. LTD - India.

DISTRIBUIDO POR:



ULTIMA REVISION
10/06/2021

AR-006 FT
APROBADO: DPTO.
REGISTROS