

	FICHA TECNICA MELTOXIDE	FT Ref. No. 18/03/2022
---	--	--------------------------------------

CARACTERISTICAS

Titular y Distribuidor:	FARMAGRO S.A.
Uso:	Fungicida agrícola
Ingrediente Activo:	Dodemorph Acetate
Concentración:	400 g/l
Formulación:	Concentrado Emulsionable (EC)
Categoría Toxicológica:	4 - Ligeramente peligroso
Grupo químico:	Morpholine

MODODEACCIÓN

Meltoxide es un fungicida sistémico con acción protectante y curativa.

MECANISMO DE ACCIÓN

Meltoxide inhibe la biosíntesis de esteroides en las membranas.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (Período de carencia)	PR
Rosas (<i>Rosa</i> sp.)	Oídio (<i>Oidium</i> sp.)	3.75 l/ha o 2.50 ml/l	No aplica	48 horas

Volumen de agua: 1500 l/ha

P.C.: Periodo de Carencia: Tiempo requerido entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Periodo de Reentrada: Tiempo requerido entre la última aplicación y la entrada de personal sin equipo de protección al área tratada.

Aplicar al observar los primeros síntomas de la plaga, cuando las condiciones sean favorables para su desarrollo.



	FICHA TECNICA MELTOXIDE	FT Ref. No. 18/03/2022
---	--	--------------------------------------

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Incompatible con productos químicos altamente reactivos, como ácido fuerte y agentes oxidantes fuertes. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis y forma recomendada en la etiqueta.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle esta ficha técnica.

Generales:	En caso de sospecharse intoxicación, detener el trabajo y buscar asistencia médica de inmediato. Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo mientras llega la ayuda médica.
Ojos:	Lavarlos con abundante agua fresca.
Ingestión:	No induzca el vómito, ni administre nada por vía oral.
Inhalación:	Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.
Piel:	Lavarse con abundante agua y jabón.
Síntomas:	Dolor de cabeza, fatiga, náuseas, dolores abdominales, vómitos y diarrea. Piel y ojos irritados.
Tratamiento y Antídoto:	Tratamiento sintomático y de apoyo. No existe antídoto específico.

